

## **Pakkausseloste: Tietoa potilaalle**

**Atenolol Sandoz 25 mg tabletit**

**Atenolol Sandoz 50 mg tabletit**

atenololi

**Lue tämä pakkausseloste huolellisesti, ennen kuin aloitat lääkkeen käyttämisen, sillä se sisältää sinulle tärkeitä tietoja.**

- Säilytä tämä pakkausseloste. Voit tarvita sitä myöhemmin.
- Jos sinulla on kysyttävää, käänny lääkärin tai apteekkihenkilökunnan puoleen.
- Tämä lääke on määrätty vain sinulle eikä sitä tule antaa muiden käyttöön. Se voi aiheuttaa haittaa muille, vaikka heillä olisikin samanlaiset oireet kuin sinulla.
- Jos havaitset haittavaikutuksia, käänny lääkärin tai apteekkihenkilökunnan puoleen. Tämä koskee myös sellaisia mahdollisia haittavaikutuksia, joita ei ole mainittu tässä pakkausselosteessa. Ks. kohta 4.

### **Tässä pakkausselosteessa kerrotaan:**

1. Mitä Atenolol Sandoz-valmiste on ja mihin sitä käytetään
2. Mitä sinun on tiedettävä, ennen kuin käytät Atenolol Sandoz-valmistetta
3. Miten Atenolol Sandoz-valmistetta käytetään
4. Mahdolliset haittavaikutukset
5. Atenolol Sandoz-valmisteen säilyttäminen
6. Pakkauksen sisältö ja muuta tietoa

### **1. Mitä Atenolol Sandoz -valmiste on ja mihin sitä käytetään**

Atenolol Sandoz-valmiste sisältää atenololia, joka kuuluu beetasalpaajien lääkeryhmään.

Atenolol Sandoz-valmistetta käytetään seuraaviin tarkoituksiin:

- korkean verenpaineen eli hypertension hoitoon
- kroonisen, stabiilin *angina pectoriksen* eli rasisrintakivun hoitoon
- tiettyjen sydämen rytmihäiriöiden hoitoon
- sydäninfarktin uusiutumisen ehkäisyyn.

Lääke hidastaa sydämen sykettä ja vähentää sydämen supistusvoimaa.

Atenololia, jota Atenolol Sandoz-valmiste sisältää, voidaan joskus käyttää myös muiden kuin tässä pakkausselosteessa mainittujen sairauksien hoitoon. Kysy neuvoa lääkäriltä, apteekkihenkilökunnalta tai muulta terveydenhuollon ammattilaiselta tarvittaessa ja noudata aina heiltä saamiasi ohjeita.

### **2. Mitä sinun on tiedettävä, ennen kuin käytät Atenolol Sandoz-valmistetta**

#### **Älä käytä Atenolol Sandoz-valmistetta**

- jos olet allerginen (yliherkkä) atenololille tai Atenolol Sandoz-valmisteen jollekin muulle aineelle (ks. luettelo kohdassa 6)
- jos sinulla on joskus ollut jokin seuraavista sydänsairauksista:
  - o sydämen vajaatoiminta, joka ei ole hallinnassa (mahdollisia oireita ovat hengenahdistus ja nilkkojen turvotus)
  - o toisen tai kolmannen asteen johtumiskatkos sydämessä (sinulla saattaa olla sydämentahdistin)
  - o hyvin hidas tai hyvin epätasainen sydämen syke, hyvin matala verenpaine tai hyvin huono verenkierto.
  - o jos sinulla on sydänperäinen sokki. Tällöin sydän ei pumpkaa verta elimistöön riittävän tehokkaasti. Mahdollisia merkkejä ovat sekavuus, hikoilu, nopea syke ja ihon kalpeus.

- jos sinulla on hoitamaton kasvain nimeltä feokromosytooma. Se sijaitsee yleensä munuaisten lähellä ja voi aiheuttaa verenpaineen nousua. Jos saat hoitoa feokromosytooman vuoksi, lääkärisi antaa sinulle Atenolol Sandozin lisäksi myös toista lääkettä, jota sanotaan alfasalpaajaksi. Verenpainetta on tarkkailtava huolellisesti.
- jos lääkäri on kertonut, että veresi on poikkeavan hapanta (metabolinen asidoosi).

Älä käytä Atenolol Sandoz-valmistetta, jos jokin näistä koskee sinua. Jos olet epävarma, kysy neuvoa lääkäriltä tai apteekista ennen lääkkeen käyttöä.

### **Varoitukset ja varotoimet**

Keskustele lääkärin tai apteekkihenkilökunnan kanssa ennen kuin käytät Atenolol Sandoz-valmistetta:

- jos sinulla on astma, hengityksen vinkumista tai muita samankaltaisia hengitysvaikeuksia tai jos saat allergisia reaktioita esimerkiksi hyönteisten pistoista. Jos sinulla on joskus ollut astma tai hengityksen vinkumista, älä ota tätä lääkettä, ennen kuin olet keskustellut lääkärin kanssa.
- jos sinulla on ns. Prinzmetalin angina (eräs rintakiputyyppe).
- jos sinulla on heikko verenkierto tai hallinnassa oleva sydämen vajaatoiminta.
- jos sinulla on I asteen sydämen johtumiskatkos.
- jos sinulla on diabetes. Lääke voi vaikuttaa liian matalan verensokerin aiheuttamiin tuntemuksiin. Saatat tuntea sykkeen kiihtymistä tai voimistumista tai saatat hikoilla. Verensokeritasoja on tarkkailtava huolellisesti.
- jos sinulla on tyreotoksikoosi (kilpirauhasen liikatoiminnan aiheuttama sairaus). Lääke voi peittää tyreotoksikoosin oireet.
- jos sinulla on munuaissairaus. Saatat tarvita tarkastuksia hoidon aikana.
- jos sinulla on psoriaasi (eräs ihotauti).
- jos sykkeesi on hidas (50–55 lyöntiä minuutissa)
- jos sinulla on kasvain nimeltä feokromosytooma, sinun tulisi saada Atenolol Sandoz -valmisteen lisäksi alfasalpaajahoitoa. Verenpainetta on tarkkailtava huolellisesti.
- jos olet iäkäs.

Keskustele lääkärin tai apteekkihenkilökunnan kanssa ennen lääkkeen käyttöä, jos jokin edellä mainituista koskee sinua (tai olet epävarma).

### **Muut lääkevalmisteet ja Atenolol Sandoz**

Kerro lääkärille tai apteekkihenkilökunnalle, jos parhaillaan käytät tai olet äskettäin käyttänyt tai saatat käyttää muita lääkkeitä. Tämä koskee myös ilman reseptiä saatavia valmisteita, kuten rohdosvalmisteita. Atenolol Sandoz-valmiste voi näet vaikuttaa muiden lääkkeiden tehoon tai päinvastoin.

Kerro lääkärille etenkin, jos käytät jotakin seuraavista lääkkeistä:

- Klonidiini (korkean verenpaineen tai migreenin hoitoon). Jos käytät samanaikaisesti sekä klonidiinia että Atenolol Sandozia, älä lopeta klonidiinin käyttöä, ellei lääkärisi kehota sinua tekemään niin. Jos klonidiinihoito on lopetettava, lääkäri antaa sinulle tarkat ohjeet sen lopettamisesta.
- Verapamiili, diltiatseemi ja nifedipiini (korkean verenpaineen tai rintakivun hoitoon).
- Disopyramidi, kinidiini ja amiodaroni (epätasaisen sydämen sykkeen hoitoon).
- Digoksiini (sydänlääke).
- Adrenaliini, joka tunnetaan myös nimellä epinefriini (sydämen toimintaa kiihdyttävä lääke).
- Ibuprofeeni tai indometasiini (kivun ja tulehduksen hoitoon).
- Insuliini tai suun kautta otettavat diabeteslääkkeet.
- Ampisilliini, jota käytetään bakteeri-infektioiden hoitoon
- Barbituraatit, joita käytetään unettomuuden ja epilepsian hoitoon
- Sultopridi ja fentiatsiinit, joita käytetään vakavien mielenterveysongelmien (psykoosien) hoitoon
- Trisykliset masennuslääkkeet ja MAO-estäjien lääkeryhmään kuuluvat masennuslääkkeet

- Vilustumisen ja nenän tai sivuonteloiden tukkoisuuden hoitoon käytettävät lääkkeet (myös itsehoitolääkkeet).
- Silmänpainetaudin tai muiden silmäsairauksien aiheuttaman silmänpaineen alentamiseen käytettävät lääkkeet.

Keskustele lääkärin tai apteekkihenkilökunnan kanssa ennen lääkkeen käyttöä, jos jokin edellä mainituista koskee sinua (tai olet epävarma).

### **Kirurgiset toimenpiteet**

Kerro anestesia- ja lääkäri- tai hoitohenkilöstölle Atenolol Sandoz -valmisteen käytöstä, jos menet sairaalaan leikkaushoitoa varten. Tiettyjen nukutus- ja puudutusaineiden käytön yhteydessä voi näet ilmetä verenpaineen laskua, jos käytät samalla Atenolol Sandoz -valmistetta. Sama pätee jodia sisältävien aineiden (varjoaineiden) käyttöön. Näitä aineita käytetään röntgenkuvauksissa.

### **Raskaus ja imetys**

Jos olet raskaana tai imetät, epäilet olevasi raskaana tai jos suunnittelet lapsen hankkimista, kysy lääkäriltä tai apteekista neuvoa ennen tämän lääkkeen käyttöä.

### **Ajaminen ja koneiden käyttö**

- Lääke ei todennäköisesti vaikuta kykyysi ajaa tai käyttää työkaluja tai koneita. Älä kuitenkaan tee näitä asioita, ennen kuin olet huomannut, miten lääke vaikuttaa sinuun.
- Älä aja autoa tai käytä työkaluja tai koneita, jos sinulla esiintyy tämän lääkkeen käyttämisen aikana huimausta tai väsymystä.

Lääke voi heikentää kykyä kuljettaa moottoriajoneuvoa tai tehdä tarkkaa keskittymistä vaativia tehtäviä. On omalla vastuullasi arvioida, pystytkö näihin tehtäviin lääkehoidon aikana. Lääkkeen vaikutuksia ja haittavaikutuksia on kuvattu muissa kappaleissa. Lue koko pakkausseloste opastukseksi. Keskustele lääkärin tai apteekkihenkilökunnan kanssa, jos olet epävarma.

## **3. Miten Atenolol Sandoz -valmistetta käytetään**

Käytä tätä lääkettä juuri siten kuin lääkäri on määrännyt. Tarkista ohjeet lääkäriltä tai apteekista, jos olet epävarma.

- Lääkäri kertoo, montako tablettia päivittäin otetaan ja mihin aikaan ne on otettava.
- Tutustu pakkauksen etikettiin. Siinä kerrataan lääkärin kertomat tiedot.
- Ota lääke mieluiten samaan aikaan joka päivä.
- Tabletti niellään kokonaisuena veden kera. Tabletissa on jakouurre osiin jakamisen helpottamiseksi, jos sinun on vaikea niellä sitä kokonaisuena.

### **Aikuiset**

Lääkäri päättää tilasi perusteella, miten suuren annoksen Atenolol Sandoz-valmistetta tarvitset päivittäin.

### **Korkea verenpaine**

- Tavanomainen aloitusannos on 25 mg kerran vuorokaudessa.
- Jatkossa otetaan yleensä 50–100 mg kerran vuorokaudessa.

### **Rintakipu**

Tavanomainen annos on 50–100 mg kerran vuorokaudessa. Jos annos on 100 mg, lääkäri saattaa kehottaa sinua jakamaan sen kahteen annokseen eli ottamaan 50 mg aamuisin ja 50 mg iltaisin.

### **Sydämen rytmihäiriöt**

Tavanomainen annos on 50–100 mg kerran vuorokaudessa.

### **Uusien sydäninfarktien ehkäisy**

Tavanomainen annos on 100 mg kerran vuorokaudessa. Lääkäri saattaa kehottaa sinua jakamaan sen kahteen annokseen eli ottamaan 50 mg aamuisin ja 50 mg iltaisin.

### **Iäkkäät potilaat**

Jos olet iäkäs, lääkäri saattaa määrätä sinulle pienemmän annoksen etenkin, jos sinulla on munuaisvaivoja.

### **Vaikeat munuaissairaudet**

Jos sinulla on vaikea munuaissairaus, lääkäri saattaa määrätä sinulle pienemmän Atenolol Sandoz -annoksen tai kehottaa sinua ottamaan lääkkeen tavallista harvemmin.

### **Lapset**

Lääkettä ei saa antaa lapsille.

### **Jos otat enemmän Atenolol Sandoz-valmistetta kuin sinun pitäisi**

- Jos olet ottanut liian suuren lääkeannoksen tai vaikkapa lapsi on ottanut lääkettä vahingossa, ota aina yhteyttä lääkäriin, sairaalaan tai Myrkytystietokeskukseen (puh. 09 471 977 Suomessa, 112 Ruotsissa) riskien arvioimiseksi ja lisäohjeiden saamiseksi.
- Ota lääkepakkaus mukaasi, jotta lääkäri tietää, mitä olet ottanut.
- Sykkeesi saattaa hidastua, ja sinulla voi olla verenpaineen laskusta johtuvaa huimausta sekä hengitysvaikeuksia. Sydän ei ehkä pysty pumppaamaan riittävästi verta elimistöön (äkillinen sydämen vajaatoiminta).

### **Jos unohtat ottaa Atenolol Sandoz-valmistetta**

- Jos unohtat ottaa annoksen, ota se heti kun muistat asian.
- Jos on kuitenkin jo melkein aika ottaa seuraava annos, jätä unohtunut annos väliin.
- Älä ota kaksinkertaista annosta korvataksesi unohtamasi annoksen.

### **Jos lopetat Atenolol Sandoz-valmisteen käytön**

Älä lopeta Atenolol Sandoz-valmisteen käyttöä keskustelematta siitä ensin lääkärin kanssa. Lääkärin neuvoa yleensä pienentämään annosta vähitellen.

Jos sinulla on kysymyksiä tämän lääkkeen käytöstä, käänny lääkärin tai apteekkihenkilökunnan puoleen.

## **4. Mahdolliset haittavaikutukset**

Kuten kaikki lääkkeet, tämäkin lääke voi aiheuttaa haittavaikutuksia. Kaikki eivät kuitenkaan niitä saa. Älä anna tämän haittavaikutusluettelon huolestuttaa sinua. Sinulle ei välttämättä kehity mitään siinä luetelluista oireista. Lääkkeen käytön yhteydessä voi esiintyä seuraavia haittavaikutuksia:

### **Lopeta Atenolol Sandoz-valmisteen käyttö ja hakeudu välittömästi lääkärin hoitoon tai sairaalaan, jos huomaat jonkin seuraavista vakavista haittavaikutuksista:**

#### **Harvinaiset (voi esiintyä enintään 1 käyttäjällä 1000:sta)**

- sydämen rytmihäiriöt, huimaus, väsymys tai pyörtyminen. Syynä voi olla sydämen johtumiskatkos.
- hengenahdistus tai nilkkojen turvotus. Syynä voi olla sydämen vajaatoiminnan puhkeaminen tai paheneminen.
- hengitysvaikeudet kuten hengityksen vinkuminen. Syynä voi olla astman paheneminen.
- tunnottomat tai kylmät varpaat ja sormet.

### **Yleisyys tuntematon**

- kasvojen tai nielun turvotus, hengitysvaikeudet tai huimaus. Nämä voivat olla vakavan allergisen reaktion merkkejä.

Lopeta Atenolol Sandoz-valmisteen käyttö ja hakeudu välittömästi lääkärin hoitoon tai sairaalaan, jos huomaat jonkin edellä mainituista haittavaikutuksista.

### **Muita haittavaikutuksia ovat:**

#### **Yleiset: voi esiintyä enintään 1 käyttäjällä 10:stä**

- käsien ja jalkaterien kylmyys tai huono verenkierto
- sykkeen hidastuminen. Tämä on normaalia. Keskustele kuitenkin lääkärin kanssa, jos asia huolestuttaa sinua.
- ripuli
- ummetus
- ruoansulatuskanavan vaivat
- pahoinvointi tai oksentelu
- väsymys
- hikoilu.

#### **Melko harvinaiset: voi esiintyä enintään 1 käyttäjällä 100:sta**

- univaikeudet
- kohonneet transaminaasiarvot (havaitaan verikokeissa).

#### **Harvinaiset: voi esiintyä enintään 1 käyttäjällä 1000:sta**

- violetit alueet ihossa
- käsien ja jalkaterien kihelmöinti ja pistely
- verenkiertohäiriöstä johtuva katkokävely, joka saattaa vaikeutua hoidon alussa
- alhainen verenpaine, joka voi aiheuttaa huimausta, pyörrytystä tai pyörtymistä
- päänsärky
- huimaus
- sekavuus, ahdistuneisuus tai pelokkuus
- painajaiset
- todellisuudentajun muutokset (psykoosit) tai näkö- tai kuuloharhat (hallusinaatiot)
- masennus
- suun kuivuminen
- hiusten oheneminen
- silmien kuivuus
- ihottuma
- kuiva ja hilseilevä iho (psoriaasi), joka saattaa vaikeutua hoidon alussa
- näköhäiriöt
- alttius mustelmille
- erektiovaikeudet miehillä (impotenssi)
- ihon tai silmänvalkuaisten keltaisuus
- veriarvojen muutokset, esimerkiksi verisoluarvojen muutokset. Lääkäri saattaa määrätä ajoittain verikokeita, joiden avulla selvitetään, vaikuttaako Atenolol Sandoz veriarvoihisi.

### **Yleisyys tuntematon**

- allergiset reaktiot (yliherkkyys) kuten kutiava ihottuma
- Atenolol Sandoz-valmiste voi peittää kilpirauhasen liikatoiminnan ja alhaisen verensokerin oireet (ks. kohta 2. ”Mitä sinun on tiedettävä ennen kuin käytät Atenolol Sandoz –valmistetta”).

### **Haittavaikutuksista ilmoittaminen**

Jos havaitset haittavaikutuksia, kerro niistä lääkärille tai apteekkihenkilökunnalle. Tämä koskee myös sellaisia mahdollisia haittavaikutuksia, joita ei ole mainittu tässä pakkausselosteessa. Voit ilmoittaa haittavaikutuksista myös suoraan Lääkealan turvallisuus- ja kehittämiskeskus Fimeaan (ks. yhteystiedot alla). Ilmoittamalla haittavaikutuksista voit auttaa saamaan enemmän tietoa tämän lääkevalmisteen turvallisuudesta.

www-sivusto: [www.fimea.fi](http://www.fimea.fi), Lääkealan turvallisuus- ja kehittämiskeskus Fimea, Lääkkeiden haittavaikutusrekisteri, PL 55, FI-00034 Fimea.

## **5. Atenolol Sandoz -valmisteen säilyttäminen**

Ei lasten ulottuville eikä näkyville.

Älä käytä Atenolol Sandoz-valmistetta pakkauksessa mainitun viimeisen käyttöpäivämäärän ("Käyt.viim." tai "EXP") jälkeen. Viimeinen käyttöpäivämäärä tarkoittaa kuukauden viimeistä päivää.

Säilytä alle 25 °C. Säilytä alkuperäispakkauksessa. Herkkä kosteudelle.

Lääkkeitä ei tule heittää viemäriin eikä hävittää talousjätteiden mukana. Kysy käyttämättömien lääkkeiden hävittämisestä apteekista. Näin menetellen suojelet luontoa.

## **6. Pakkauksen sisältö ja muuta tietoa**

### **Mitä Atenolol Sandoz sisältää**

Atenolol Sandoz 25 mg tabletti:

Vaikuttava aine on atenololi.

Yksi tabletti sisältää 25 mg atenololia.

Atenolol Sandoz 50 mg tabletti:

Vaikuttava aine on atenololi.

Yksi tabletti sisältää 50 mg atenololia.

Muut aineet ovat:

povidoni K25, maissitärkkelys, mikrokiteinen selluloosa, natriumtärkkelysglykolaatti, magnesiumstearaatti ja vedetön kolloidinen piidioksidi.

### **Lääkevalmisteen kuvaus ja pakkauskoot**

Atenolol Sandoz 25 mg tabletti on valkoinen, pyöreä kaksoiskupera tabletti, jonka toisella puolella on merkintä "25" ja toisella puolella jakouurre. Lämpimitt: 7 mm.

Atenolol Sandoz 50 mg tabletti on valkoinen, pyöreä kaksoiskupera tabletti, jonka toisella puolella on merkintä "50" ja toisella puolella jakouurre. Lämpimitt: 8 mm.

Atenolol Sandoz 25 mg tabletti

PVC/Al-läpipainopakkaus.

Pakkauskoot: 28, 30, 56, 100, 100 x 1 ja 250 tablettia.

Atenolol Sandoz 50 mg tabletti

PVC/Al-läpipainopakkaus.

Pakkauskoot: 14, 20, 28, 30, 50, 56, 60, 98, 100, 100 x 1, 300 ja 500 tablettia.

**Myyntiluvan haltija ja valmistaja**

*Myyntiluvan haltija:*

Sandoz GmbH, Biochemiestrassen 10, A-6250 Kundl, Itävalta

*Valmistaja:*

Salutas Pharma GmbH, Otto-von-Guericke-Allee 1, 39179 Barleben, Saksa

**Tämä pakkausseloste on tarkistettu viimeksi**

06.02.2019

## **Bipacksedel: Information till patienten**

**Atenolol Sandoz 25 mg tabletter**

**Atenolol Sandoz 50 mg tabletter**

atenolol

**Läs noga igenom denna bipacksedel innan du börjar använda detta läkemedel. Den innehåller information som är viktig för dig.**

- Spara denna information, du kan behöva läsa den igen.
- Om du har ytterligare frågor vänd dig till läkare eller apotekspersonal.
- Detta läkemedel har ordinerats enbart åt dig. Ge det inte till andra. Det kan skada dem, även om de uppvisar sjukdomstecken som liknar dina.
- Om du får biverkningar, tala med läkare eller apotekspersonal. Detta gäller även eventuella biverkningar som inte nämns i denna information. Se avsnitt 4.

**I denna bipacksedel finns information om följande:**

1. Vad Atenolol Sandoz är och vad det används för
2. Vad du behöver veta innan du använder Atenolol Sandoz
3. Hur du använder Atenolol Sandoz
4. Eventuella biverkningar
5. Hur Atenolol Sandoz ska förvaras
6. Förpackningens innehåll och övriga upplysningar

### **1. Vad Atenolol Sandoz är och vad det används för**

Atenolol Sandoz innehåller en aktiv substans som heter atenolol och som hör till en grupp läkemedel som kallas betablockerare.

Atenolol Sandoz används för:

- behandling av högt blodtryck (hypertension)
- behandling av bröstsmärta på grund av kronisk stabil kärlkramp
- behandling av vissa former av oregelbunden hjärtrytm (arytmi)
- förebyggande av ytterligare hjärtinfarkt

Läkemedlet verkar genom att sänka hastigheten och kraften med vilken hjärtat slår (pulsen).

Atenolol som finns i Atenolol Sandoz kan också vara godkänd för att behandla andra sjukdomar som inte nämns i denna bipacksedel. Fråga läkare, apotekspersonal eller annan hälso- och sjukvårdspersonal om du har ytterligare frågor och följ alltid deras instruktion.

### **2. Vad du behöver veta innan du använder Atenolol Sandoz**

**Ta inte Atenolol Sandoz:**

- om du är allergisk mot atenolol eller något annat innehållsämne i detta läkemedel (anges i avsnitt 6).
- om du har haft något av följande hjärtproblem:
  - hjärtsvikt som inte är under kontroll (detta leder vanligtvis till att du blir andfådd och till att fotlederna svullnar).
  - hjärtblock av andra eller tredje graden (ett tillstånd som kan behandlas med en pacemaker)
  - mycket långsamma eller oregelbundna hjärtslag, mycket lågt blodtryck eller mycket dålig cirkulation
  - kardiogen chock. Det innebär att hjärtat inte pumpar runt blodet i kroppen tillräckligt bra. Tecken på detta kan omfatta förvirring, svettning, snabba hjärtslag och blek hud



- om du har en tumör som kallas feokromocytom som du inte behandlas för. Tumören sitter vanligtvis bredvid njurarna och kan leda till högt blodtryck. Om du behandlas för feokromocytom kommer läkaren att ge dig ett annat läkemedel, en alfablockerare, som du ska ta tillsammans med Atenolol Sandoz. Blodtrycket ska övervakas noggrant.
- om du har fått veta att du har förhöjda syranivåer i blodet (metabolisk acidosis).

Ta inte Atenolol Sandoz om något av det ovanstående gäller dig. Om du är osäker, ska du tala med din läkare eller med apotekspersonal innan du börjar ta detta läkemedel.

### Varningar och försiktighet

Tala med läkare eller apotekspersonal innan du tar Atenolol Sandoz om:

- du har astma, pipande andning eller liknande andningsproblem, eller om du får allergiska reaktioner, t.ex. av insektsbett. Om du har haft astma eller pipande andning ska du inte ta detta läkemedel utan att först tala med läkare.
- du har en typ av bröstsmärta (angina) som kallas Prinzmetals angina.
- du har dålig blodcirkulation eller kontrollerad hjärtsvikt.
- du har hjärtblock av första graden.
- du har diabetes. Ditt läkemedel kan förändra hur du reagerar på lågt blodsocker. Du kan känna att ditt hjärta slår snabbare eller starkare och du kan känna dig svettig. Dina blodsockernivåer ska övervakas noggrant.
- du har tyreotoxikos (ett tillstånd som orsakas av en överaktiv sköldkörtel). Läkemedlet kan dölja symtomen på tyreotoxikos.
- du har problem med njurarna. Du kan behöva gå på kontroller under behandling.
- du har en hudsjukdom som kallas psoriasis.
- du har låg puls (50–55 slag per minut).
- du har en tumör som kallas feokromocytom ska du också behandlas med en typ av läkemedel som kallas alfablockerare i tillägg till Atenolol Sandoz. Blodtrycket ska övervakas noggrant.
- du är en äldre person.

Om något av det ovanstående gäller dig (eller om du är osäker), ska du tala med din läkare eller med apotekspersonal innan du börjar ta detta läkemedel.

### Andra läkemedel och Atenolol Sandoz

Tala om för läkare eller apotekspersonal om du tar, nyligen har tagit eller kan tänkas ta andra läkemedel. Detta omfattar även receptfria läkemedel som t.ex. naturpreparat. Orsaken till detta är att Atenolol Sandoz kan påverka eller påverkas av andra läkemedel.

Tala särskilt om för läkaren om du tar något av följande läkemedel:

- Klonidin (mot högt blodtryck eller migrän). Om du tar klonidin och Atenolol Sandoz tillsammans, ska du inte sluta ta klonidin om inte läkaren har sagt att du ska göra det. Om du måste sluta ta klonidin får du noggranna anvisningar av läkaren om hur du ska göra det.
- Verapamil, diltiazem och nifedipin (mot högt blodtryck eller bröstsmärta).
- Disopyramid, kinidin eller amiodaron (mot oregelbundna hjärtslag).
- Digoxin (mot hjärtproblem).
- Adrenalin, även kallat epinefrin (ett läkemedel som stimulerar hjärtat).
- Ibuprofen eller indometacin (mot smärta och inflammation).
- Insulin eller läkemedel för diabetes som du tar via munnen.
- Ampicillin mot bakteriella infektioner.
- Barbiturater mot sömnproblem eller epilepsi.
- Sultoprid och fentiaziner mot mer allvarliga psykiska problem (psykos).
- Läkemedel mot depression ur de grupper som kallas ”tricykliska antidepressiva” eller ”MAO-hämmare”.
- Läkemedel för att behandla täppt näsa eller täppta bihålor eller förkylningsläkemedel (inklusive sådana du kan köpa på apoteket)
- Läkemedel för att minska trycket i ögat på grund av glaukom eller andra ögonproblem.

Om något av det ovanstående gäller dig (eller om du är osäker), ska du tala med din läkare eller med apotekspersonal innan du börjar ta detta läkemedel.

### **Operationer**

Om du ska läggas in på sjukhus för en operation, tala om för narkosläkaren eller vårdpersonalen att du tar Atenolol Sandoz. Anledningen till detta är att du kan få lågt blodtryck (hypotoni) om du får vissa bedövnings- eller narkosmedel eller ämnen som innehåller jod (kallas kontrastmedel) för röntgen när du tar Atenolol Sandoz.

### **Graviditet och amning**

Om du är gravid eller ammar, tror att du kan vara gravid eller planerar att skaffa barn, rådfråga läkare eller apotekspersonal innan du använder detta läkemedel.

### **Körförmåga och användning av maskiner**

- Det är inte troligt att detta läkemedel påverkar din förmåga att köra bil eller använda verktyg eller maskiner, men det är bäst att vänta och se hur läkemedlet påverkar dig innan du utför någon av dessa aktiviteter.
- Om du känner dig yr eller trött när du tar detta läkemedel ska du inte köra bil eller använda verktyg eller maskiner.

Du är själv ansvarig för att bedöma om du är i kondition att framföra motorfordon eller utföra arbeten som kräver skärpt uppmärksamhet. En av faktorerna som kan påverka din förmåga i dessa avseenden är användning av läkemedel på grund av deras effekter och/eller biverkningar. Beskrivning av dessa effekter och biverkningar finns i andra avsnitt. Läs därför all information i denna bipacksedel för vägledning. Diskutera med din läkare eller apotekspersonal om du är osäker.

## **3. Hur du använder Atenolol Sandoz**

Använd alltid Atenolol Sandoz enligt läkarens anvisningar. Rådfråga läkare eller apotekspersonal om du är osäker.

- Din läkare talar om för dig hur många tabletter du ska ta dagligen och när du ska ta dem.
- Läs etiketten på förpackningen för att påminna dig om vad läkaren sagt.
- Sträva efter att ta tabletterna samma tid varje dag.
- Svälj tabletterna hela med vatten. Brytskåran finns endast till för att hjälpa dig dela tabletten om du har svårt att svälja den hel.

### **Vuxna**

Din läkare avgör hur mycket Atenolol Sandoz du ska ta varje dag beroende på ditt tillstånd.

### **Högt blodtryck**

- Vanlig inledningsdos är 25 mg en gång dagligen.
- Därefter tar man i allmänhet mellan 50 mg och 100 mg en gång dagligen.

### **Bröstsmärta**

Vanlig dos är mellan 50 mg och 100 mg en gång dagligen. Om du tar 100 mg, kan din läkare be dig att ta denna dos i två skilda doser, d.v.s. 50 mg på morgonen och 50 mg på kvällen.

### **Oregelbunden hjärtrytm**

Vanlig dos är mellan 50 mg och 100 mg en gång dagligen.

### **Förebyggande av ytterligare hjärtinfarkt**

Vanlig dos är 100 mg en gång dagligen. Din läkare kan be dig att ta denna dos i två skilda doser, d.v.s. 50 mg på morgonen och 50 mg på kvällen.

## **Äldre personer**

Om du är äldre, kanske din läkare ordinerar en lägre dos, särskilt om du har njurfel.

## **Personer med svårt njurfel**

Om du har svårt njurfel, kan din läkare ordinera en lägre dos av Atenolol Sandoz eller uppmana dig att ta läkemedlet mera sällan.

## **Barn**

Detta läkemedel får inte ges till barn.

## **Om du har tagit för stor mängd av Atenolol Sandoz**

- Om du fått i dig för stor mängd läkemedel eller om t.ex. ett barn fått i sig läkemedlet av misstag kontakta läkare, sjukhus eller Giftinformationscentralen (tel. 112 i Sverige och tel. 09-471 977 i Finland) för bedömning av risken samt rådgivning.
- Ta läkemedelsförpackningen med dig så att läkaren vet vad du tagit.
- Symtom på överdosering kan vara långsam puls, yrsel på grund av lågt blodtryck och andningssvårigheter. Hjärtat kan också få svårt att förse resten av kroppen med blod (akut hjärtsvikt).

## **Om du har glömt att ta Atenolol Sandoz**

- Om du glömmet en dos, ta den genast då du kommer ihåg.
- Om det dock är nästan tid att ta nästa dos, ska du hoppa över den glömda dosen.
- Ta inte dubbel dos för att kompensera för glömd dos.

## **Om du slutar att ta Atenolol Sandoz**

Sluta inte att ta Atenolol Sandoz utan att ha talat med din läkare först. Läkaren kan behöva minska dosen långsamt.

Om du har ytterligare frågor om detta läkemedel kontakta läkare eller apotekspersonal.

## **4. Eventuella biverkningar**

Liksom alla läkemedel kan detta läkemedel orsaka biverkningar men alla användare behöver inte få dem. Du ska inte bli orolig över denna förteckning över biverkningar. Du kanske inte upplever en enda av dem. Följande biverkningar kan förekomma hos användare av denna medicin:

### **Sluta ta Atenolol Sandoz och uppsök genast läkare eller sjukhus om du upplever någon av följande allvarliga biverkningar:**

#### **Sällsynta (kan förekomma hos upp till 1 av 1 000 användare):**

- Onormal hjärtrytm, känsla av yrsel, trötthet eller svimning. Detta kan vara tecken på hjärtblock.
- Andfåddhet eller svullna vrister. Detta kunde vara tecken på hjärtsvikt eller på försämring av befintlig hjärtsvikt.
- Andningsproblem, t.ex. vinande eller pipande andning. Detta kan vara tecken på förvärrad astma.
- Domnande eller kalla tår och fingrar.

#### **Har rapporterats (förekommer hos okänt antal användare):**

- Svullnad av ansikte eller svalg, svårt att andas eller yrsel. Detta kan vara tecken på en allvarlig allergisk reaktion.

Sluta ta Atenolol Sandoz och uppsök genast läkare eller sjukhus om du upplever någon av de biverkningar som nämndes ovan.

#### **Andra biverkningar:**

**Vanliga (kan förekomma hos upp till 1 av 10 användare):**

- kalla fötter och händer eller dålig blodcirkulation i dem
- långsam puls. Detta är normalt, men om du är orolig, tala om detta med din läkare.
- diarré
- förstoppning
- matsmältningsbesvär
- illamående eller kräkning
- trötthet
- svettning.

**Mindre vanliga (kan förekomma hos upp till 1 av 100 användare):**

- sömnsvårigheter
- höga värden för ett enzym som kallas transaminas (syns i blodprover).

**Sällsynta (kan förekomma hos upp till 1 av 1 000 användare):**

- lila fläckar på huden
- pirningar och stickningar i händer och fötter
- dålig blodcirkulation som orsakar fönstertittarsjuka (intermittent hälta) och som kan bli svårare då du börjar använda detta läkemedel
- lågt blodtryck som kan orsaka yrsel, svindel eller svimning
- huvudvärk
- yrsel
- förvirring, oro eller rädsla
- mardrömmar
- personlighetsförändringar (psykoser) eller att se eller höra något som inte finns i verkligheten (hallucinationer)
- depression
- muntorrhet
- hårtunning
- torra ögon
- utslag
- torr, flagande hud (psoriasis) som kan bli värre då du börjar använda detta läkemedel
- synproblem
- lättare att få blåmärken eller violetta fläckar på huden
- erektionsproblem (impotens)
- gul hud eller gula ögonvitor (gulsot)
- blodproblem, t.ex. förändringar i blodceller. Din läkare tar kanske blodprov emellanåt för att kontrollera om Atenolol Sandoz har påverkat ditt blod.

**Har rapporterats (förekommer hos okänt antal användare):**

- allergiska reaktioner (överkänslighetsreaktioner), t.ex. kliande hudutslag
- Atenolol Sandoz kan dölja symtomen på överfunktion av sköldkörteln och på lågt blodsocker (diabetes) (se avsnitt 2 "Vad du behöver veta innan du använder Atenolol Sandoz").

**Rapportering av biverkningar**

Om du får biverkningar, tala med läkare eller apotekspersonal. Detta gäller även biverkningar som inte nämns i denna information. Du kan också rapportera biverkningar direkt (se detaljer nedan). Genom att rapportera biverkningar kan du bidra till att öka informationen om läkemedlets säkerhet.

Sverige: Läkemedelsverket, Box 26, 751 03 Uppsala. Webbplats: [www.lakemedelsverket.se](http://www.lakemedelsverket.se)  
Finland: Säkerhets- och utvecklingscentret för läkemedelsområdet Fimea, Biverkningsregistret PB55, FI-00034 Fimea. Webbplats: [www.fimea.fi](http://www.fimea.fi)

## 5. Hur Atenolol Sandoz ska förvaras

Förvara detta läkemedel utom syn- och räckhåll för barn.

Används före utgångsdatum som anges på förpackningen efter Utg.dat. eller EXP. Utgångsdatumet är sista dagen i angiven månad.

Förvaras vid högst 25°C.

Förvaras i originalförpackningen. Fuktkänsligt.

Läkemedel ska inte kastas i avloppet eller bland hushållsavfall. Fråga apotekspersonal hur man kastar läkemedel som inte längre används. Dessa åtgärder är till för att skydda miljön.

## 6. Förpackningens innehåll och övriga upplysningar

### Innehållsdeklaration

Atenolol Sandoz 25 mg tabletter:

Den aktiva substansen är atenolol.

En tablett innehåller 25 mg atenolol.

Atenolol Sandoz 50 mg tabletter:

Den aktiva substansen är atenolol.

En tablett innehåller 50 mg atenolol.

Övriga innehållsämnen är:

Povidon K25, majsstärkelse, mikrokristallin cellulosa, natriumstärkelseglykolat, magnesiumstearat och kiseldioxid, kolloidal, vattenfri.

### Läkemedlets utseende och förpackningsstorlekar

Atenolol Sandoz 25 mg tabletter är vita, runda bikonvexa tabletter. Ena sidan är märkt "25" och motsatt sida har en skåra. Diameter: 7 mm.

Atenolol Sandoz 50 mg tabletter är vita, runda bikonvexa tabletter. Ena sidan är märkt "50" och motsatt sida har en skåra. Diameter: 8 mm.

Atenolol Sandoz 25 mg tabletter

PVC/aluminiumblister.

Förpackningsstorlekar: 28, 30, 56, 100, 100 x 1 och 250 tabletter.

Atenolol Sandoz 50 mg tabletter

PVC/aluminiumblister.

Förpackningsstorlekar: 14, 20, 28, 30, 50, 56, 60, 98, 100, 100x1, 300 och 500 tabletter.

Eventuellt kommer inte alla förpackningsstorlekar att marknadsföras.

### Innehavare av godkännande för försäljning och tillverkare

*Innehavare av godkännande för försäljning*

Sandoz GmbH, Biochemiestrasse 10, A-6250 Kundl, Österrike

*Tillverkare*

Salutas Pharma GmbH, Otto-von-Guericke-Allee 1, 39179 Barleben, Tyskland

### Denna bipacksedel ändrades senast

06.02.2019 i Finland

2019-02-05 i Sverige